

# Agromet Advisory Bulletin

Andaman and Nicobar Islands

No: AB (E)/12/2023-24/100

Issued on: 12<sup>th</sup> Dec, 2023

Validity Period: 13<sup>th</sup> to 17<sup>th</sup> Dec, 2023

## Medium Range Weather Forecast: (13<sup>th</sup> to 17<sup>th</sup> Dec, 2023)

Partly cloudy weather with light to moderate rainfall is likely to occur over Andaman and Nicobar Islands during next five day. The maximum temperature will be 30.4 to 31.5 °C with minimum temperature of 24.5 to 26.3 °C, whereas the maximum and minimum relative humidity is expected to be in the range of 78 to 84 % and 72 to 80 %, respectively in Andaman and Nicobar Islands. Wind speed of 13.0 to 23.0 kmph is expected mostly from North Easterly direction.

## Weather based agro advisories (13<sup>th</sup> to 17<sup>th</sup> Dec, 2023)

### For South Andaman

#### ( Blocks: Prothrapur, Little-Andaman and Ferrargunj)

- Remove stagnated water from the paddy field to avoid lodging.
- Plough the land to destroy weeds and break the clods in upland region for cultivation of pulses and vegetables.
- Do weeding and earthing up in vegetables like okra, cauliflower and cabbage.
- Prepare raised beds for raising brinjal and chilli nursery and use seeds @ 400-500 g/ha.
- Stock carp fingerlings @ 1/m<sup>2</sup> in fish ponds. Feed with rice bran and groundnut cake mixture @ 1:1 ratio at 5 % of their body weight.
- Provide vitamins and mineral mixture to reduce summer and walking stress for livestock species.

### For North and Middle Andaman

#### ( Blocks: Rangat, Mayabunder and Diglipur).

- Remove stagnated water from the paddy field to avoid lodging.
- Plough the land to destroy weeds and break the clods in upland region for cultivation of pulses and vegetables.
- Do weeding and earthing up in vegetables like okra, cauliflower and cabbage.
- Prepare raised beds for raising brinjal and chilli nursery and use seeds @ 400-500 g/ha.
- Stock carp fingerlings @ 1/m<sup>2</sup> in fish ponds. Feed with rice bran and groundnut cake mixture @ 1:1 ratio at 5 % of their body weight.

- Provide vitamins and mineral mixture to reduce summer and walking stress for livestock species.

## **For Nicobar**

### **(Blocks: Nan-Cowrie, Car-Nicobar and Campbell-Bay)**

- Remove stagnated water from the paddy field to avoid lodging.
- Campbell Bay farmers can plough the land to destroy weeds and break the clods in upland region for cultivation of pulses and vegetables.
- Do weeding and earthing up in vegetables like okra, cauliflower and cabbage.
- Prepare raised beds for raising brinjal and chilli nursery and use seeds @ 400-500 g/ha.
- Stock carp fingerlings @ 1/m<sup>2</sup> in fish ponds. Feed with rice bran and groundnut cake mixture @ 1:1 ratio at 5 % of their body weight.
- Provide vitamins and mineral mixture to reduce summer and walking stress for livestock species.

Coordinator-AAB  
NRM division  
CARI, Port Blair

---

*For more information call CIARI toll free No. 1800 345 3193*

## मौसम परामर्श बुलेटिन

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह

जारी करने की तारीख: 12 दिसम्बर, 2023

मध्यम अवधि मौसम पुर्वानुमान (13 से 17 दिसम्बर, 2023)

संख्या: AB(H)/12/2023-24/100

समयावधि: 13 से 17 दिसम्बर, 2023

अगले पांच दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आंशिक रूप से बादल छाये रहने तथा हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इस अवधि के दौरान द्वीपसमूह में अधिकतम तापमान  $30.4^{\circ}$  से  $31.5^{\circ}$  सेल्सियस रहेगा एवं न्यूनतम तापमान  $24.5^{\circ}$  से  $26.6^{\circ}$  सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 78 से 84 प्रतिशत तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 72 से 80 प्रतिशत रहेगा। अधिकतर उत्तर पूर्वी दिशा से 13.0 से 23.0 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

मौसम आधारित कृषि सलाह (13 से 17 दिसम्बर, 2023)

दक्षिण अंडमान के लिए

(ब्लौक: प्रोश्रापुर, लिटिल-अंडमान एवं फरारगंज)

- धान गिरने से बचाने हेतु खेत से जमा हुआ पानी को हटायें।
- ऊपरी क्षेत्र में दाल और सब्जियों की खेती के लिए भूमि की जुताई करके खरपतवारों को नष्ट करें और मिट्टी के ढेलों को तोड़े।
- सब्जि जैसी भिंडी, फूलगोभी और पत्तागोभी में निराई-गुड़ाई करें और मिट्टी को ऊपर चढ़ायें।
- बैंगन और मिर्च की नर्सरी उगाने के लिए ऊँची बेड तैयार करें और 400-500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें।
- कार्प मछलीयों की अंगुलिका 1 प्रति  $m^2$  की दर से मछली तालाबों में स्टॉक करें। चावल की भूसी और मूँगफली केक का मिश्रण 1:1 अनुपात में मछलीयों की शरीर के वजन के 5% के दर से खिलाएं।
- पशुधन प्रजातियों को गर्मी और चलने के वजह से होने वाले तनाव को कम करने के लिए विटामिन और खनिज मिश्रण प्रदान करें।

उत्तर और मध्य अंडमान के लिए

(ब्लौक: रंगत, मायाबंदर एवं डिगलीपुर)

- धान गिरने से बचाने हेतु खेत से जमा हुआ पानी को हटायें।
- ऊपरी क्षेत्र में दाल और सब्जियों की खेती के लिए भूमि की जुताई करके खरपतवारों को नष्ट करें और मिट्टी के ढेलों को तोड़े।

- सब्जि जैसी भिंडी, फूलगोभी और पत्तागोभी में निराई-गुडाई करें और मिट्टी को ऊपर चढ़ायें।
- बैंगन और मिर्च की नर्सरी उगाने के लिए ऊँची बेड तैयार करें और 400-500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें।
- कार्प मछलीयों की अंगुलिका 1 प्रति  $m^2$  की दर से मछली तालाबों में स्टॉक करें। चावल की भूसी और मूंगफली केक का मिश्रण 1:1 अनुपात में मछलीयों की शरीर के वजन के 5 % के दर से खिलाएं।
- पशुधन प्रजातियों को गर्मी और चलने के वजह से होने वाले तनाव को कम करने के लिए विटामिन और खनिज मिश्रण प्रदान करें।

## निकोबारकेलिए

(ब्लौक: नन्कोन्नी, कारनिकोबार एवं कैम्पबेलबे)

- धान गिरने से बचाने हेतु खेत से जमा हुआ पानी को हटायें।
- ऊपरी क्षेत्र में दाल और सब्जियों की खेती के लिए कैम्पबेलबे के किसान भूमि की जुताई करके खरपतवारों को नष्ट करें और मिट्टी के ढेलों को तोड़े।
- सब्जि जैसी भिंडी, फूलगोभी और पत्तागोभी में निराई-गुडाई करें और मिट्टी को ऊपर चढ़ायें।
- बैंगन और मिर्च की नर्सरी उगाने के लिए ऊँची बेड तैयार करें और 400-500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें।
- कार्प मछलीयों की अंगुलिका 1 प्रति  $m^2$  की दर से मछली तालाबों में स्टॉक करें। चावल की भूसी और मूंगफली केक का मिश्रण 1:1 अनुपात में मछलीयों की शरीर के वजन के 5 % के दर से खिलाएं।
- पशुधन प्रजातियों को गर्मी और चलने के वजह से होने वाले तनाव को कम करने के लिए विटामिन और खनिज मिश्रण प्रदान करें।

Coordinator-AAB  
NRM division  
CARI, Port Blair

---

विस्तृत जानकारी के लिए टोलफ्री नम्बर 1800 345 3139 पर सम्पर्क करें।